

危

危

”， 为何？
 今 以 一个乡 反 园出 大 “ ” 。 了
 ， ， 之一，
 可为 叶、 ，以为 和 为主。



“ ”

一、危 :

1、叶 : 叶后 2~3 即可发 ，叶 、叶 叶 两侧出 不 ，
 叶 到叶 基 ， 叶 下垂，严 个叶丛 ， ，后
 可产 ；

2、 : 多从 ， 坏 ， 及 呈 ，受
 下垂



二、发 病：

原 为 病菌，在上一冬（僵）、叶和茎上冬；
 件（20℃左右、土壤湿度30%以上），产大孢子，侵染、传
 播，侵为茎、叶，在叶和茎上为6-7天，茎上为9-10

天；

叶低多，发叶、茎；茎低多，茎，则
 受严；不以及茎，势，体；外，
 地园、土壤、不以及园也发。

了区、乡在4-10右，后
 一5-10，；且内中在18℃-23℃，
 加之多，为传及侵供了利件，发。

三、防治：

- 1、加 培：增，中元充，增势，力；合
 修剪，使冠内光，后及。
- 2、及 园：后，上和地僵、叶和，出园外中
 埋，从减冬；发初，及剪，叶、。
- 3、剂：可在前使国光200-300倍 + (50%基)
 600-800倍园，使国光利(50%利)1000-1500倍（发
 严园）+ 利（80%代）800倍，后7右使国光健1500倍 + 利
 800倍。

因 区域、品 种、 候 件、 件及 培 各 不同， 发
况也会 不同，以上 和 仅供参 考，各 园 况

。